



## 佩你安錠

## Cyproheptadine (Pilian<sup>®</sup>) 4 mg/tab



### 為什麼要使用這個藥？

此藥品是一種抗組織胺藥，可以用來治療花粉症、感冒及過敏症狀，如流鼻水，眼睛癢、腫、流眼淚。若為了其他用途使用本藥，請與醫師確認。

### 應該如何使用此藥物？

請確實依照醫師指示服用正確藥量，通常一天服用 2-3 次。不可自行增減藥量，若有任何疑問都可以詢問醫師或藥師。

### 如果忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請略過之前劑量，直接使用下一次劑量，切勿重複用藥。

### 使用這個藥品可能引起之副作用？

此藥品所引起的副作用並不常見，但還是可能會發生。

常見的副作用：口乾、疲勞、嗜睡、無力、頻尿等。若以上症狀持續或變嚴重，請儘快告知醫師。

如果您有任何以下之過敏性反應，請立即就醫：皮膚過敏，呼吸困難，臉，嘴唇，舌頭或喉嚨腫脹。

### 如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

### 注意事項：

1. 此藥品使用期間，可能會造成嗜睡、昏眩等情形，請避免開車或操作機械。
2. 年紀較大的病患可能會對此藥的反應較大，如眩暈、鎮靜、低血壓情形。請遵照醫師的指示並小心使用。
3. 新生兒、早產兒、授乳媽媽、年老虛弱之病患，須由醫師之指示，請勿擅自服藥。

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。