

Tetracycline eye Oint

作用：

革蘭氏陽性、陰性細菌引起之眼部感染、如急、慢性結膜炎、瞼緣結膜炎、急性角膜潰瘍、砂眼手術後感染之預防。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請確實按照醫師處方指示服用。
- ◆ 本藥應於室溫下避光貯存，遠離熱源及濕氣。
- ◆ 應置於攝氏 15~25 度乾燥處所。
- ◆ 如發生變質或過期，不可再使用。

假如我忘記使用該怎麼辦？

- ◆ 耐心的治療，配合醫師指示及處方。
- ◆ 若已接近服用下一次的時間，不要使用，千萬不要一次使用兩倍藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 請遵照醫師或藥師指示使用。
- ◆ 眼用及外用藥膏；不可口服。
- ◆ 併用藥物也可能會加強其降低血鉀的作用，建議應監測血清中的鉀離子濃度。

醫療提示：

- ◆ 點眼藥膏前要先洗手，以免經手指接觸而感染。
- ◆ 將眼藥膏點在結膜穹窿，即眼白與下眼瞼之間的凹溝內。眼藥膏約擠出一公分長。
- ◆ 注意：眼藥膏容器尖端不可以接觸到睫毛或眼睛，以防藥膏受污染。
- ◆ 點眼藥膏輕輕閉上眼睛至少五分鐘。如須點眼藥水及眼藥膏時，先點眼藥水，間隔5~10分鐘再點眼藥膏，如使用兩種眼藥膏時，二者至少相隔10分鐘。
- ◆ 請遵照醫師或藥師指示使用。

可能引起的副作用：

- ◆ 皮膚疹、過敏症狀。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～

佛教大林慈濟綜合醫院藥劑部

地址：嘉義縣大林鎮民生路 2 號

藥物諮詢專線：05-2648000 分機 5384

藥物諮詢信箱：dic@tzuchi.com.tw