

Leuprorelin (Leuplin Depot[®], 柳菩林)

作用：

前列腺癌、用作停經前的乳癌輔助治療。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵照醫師指示使用。
- ◆ 藥品應置於 15 ~ 25°C 乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。
- ◆ 藥物放置處應遠離兒童。
- ◆ 不要將藥物與他人分享。

是否可以與其他藥物一起服用？

- ◆ 靜脈點滴注射時，將溶解的藥劑加入 5% 葡萄糖注射液或生理食鹽水等使用。
- ◆ 請勿和其他藥液混合。
- ◆ 本劑可經由皮下注射、靜脈注射、靜脈點滴注射。當施行靜脈注射時，應儘可能緩慢投予。

醫療提示：

- ◆ 對 leuprorelin、GnRH 或 GnRH 相似物過敏者。
- ◆ 懷孕及哺乳婦女忌用。
- ◆ 患有心臟衰竭、骨質疏鬆、心血管病、陰部異常出血人士要小心使用。
- ◆ 如發現有陰部異常出血的情況，應立即通知醫護人員。
- ◆ 此藥可使人昏昏欲睡，如有此情形，不得駕駛及動用機械。
- ◆ 若遇上潮熱的情況，可穿著質料較薄的衣服；若情況嚴重，應立即告知醫護人員如出現情緒不穩定或記憶力改變的情況，應立即通知醫護人員。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：
暗瘡、胸部腫脹、頭痛、潮熱、食慾不振、皮疹、骨及關節疼痛、失眠。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～