

## Testosterone Cypionate (Testosterone<sup>®</sup>，持效睪丸素)

作用：

治療先天性睪丸發育不全、更年期障礙、前列腺肥大症、性腺機能減退症及男性賀爾蒙分泌不足所引起之病症。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵照醫師指示使用。
- ◆ 配製前，請於室溫避光儲存。
- ◆ 藥物放置處應遠離兒童。
- ◆ 不要將藥物與他人分享。

是否可以與其他藥物一起使用？

- ◆ 對本劑過敏者禁用。
- ◆ 建議使用途徑：肌肉注射。
- ◆ 建議劑量：每次 200~400 mg，每 3~4 週注射一次。

醫療提示：

- ◆ 前列腺癌、男性乳癌等需慎重使用。
- ◆ 肝機能異常，應慎重使用。
- ◆ 心臟病、腎臟病、骨癌症已轉移之患者，應慎重投藥或禁用之。
- ◆ 孕婦禁用。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：  
腹部絞痛、頭痛、血壓升高、心跳徐緩、增加週邊阻力。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～

佛教大林慈濟綜合醫院藥劑科

地址：嘉義縣大林鎮民生路 2 號

藥物諮詢專線：05-2648000 分機 5384

藥物諮詢信箱：dic@tzuchi.com.tw