

Acemetacin

◆成分劑量：

Acemetacin 90 mg/長效膠囊

◆藥品作用：

Acemetacin 用來治療因風濕性關節炎、退化性關節炎（骨關節炎）、僵直性脊椎炎、痛風、肌肉炎、腱炎、腱鞘炎、滑囊炎所引起之疼痛及發炎症狀。此藥亦可治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆該如何使用此藥品？

請確實依照醫師指示服用，通常一天服用 1-2 次，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若有任何疑問都可以詢問醫師或藥師。

◆忘記服藥時該怎麼辦？

若您的醫師請您定時服用 Acemetacin，儘可能在您想起時立刻補服；若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而

服用雙倍藥量。

◆使用此藥品須注意什麼事項？

- 1.曾對 Acemetacin 過敏者，請勿使用。對 Indomethacin 過敏者，也需告知醫師。
- 2.請告訴醫師及藥師您目前服用的藥物(包括處方藥或成藥)，特別是抗凝血劑 Warfarin、Aspirin、Cyclosporine、Digoxin、Allopurinol、Phenytoin、Carbamazepine、Phenobarbital、Methotrexate、Lithium、Penicillin。
- 3.請告訴醫師是否患有肝腎疾病、心臟相關疾病、高血壓、胃潰瘍、癲癇、帕金森氏症。
- 4.若您有懷孕、授乳期之情形，請事先告知醫師。
- 5.若服用 Acemetacin 期間造成胃不舒服，可與食物或牛奶併服，以減輕不適感。

◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

此藥品於一般劑量下使用，通常無特殊副作用，但若出現嚴重症狀或

無法消除的副作用請儘速就醫。

- 1.腸胃不適、皮疹。
- 2.如過敏反應：如臉、手搔癢、水腫、蕁麻疹或口腔喉嚨腫脹、刺痛、胸悶及呼吸困難、深色尿液或灰白色糞便、解黑便或大便有血、異常出血或挫傷、頭重腳輕、頭暈、虛弱、盜汗、噁心嘔吐、皮膚眼睛發黃，請立即告知您的醫師。Acemetacin 也有可能造成其他的副作用；若服藥後出現任何問題，也請您通知您的醫師。

◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

◆是否有其他我應該知道的資訊？

一般狀況下本藥品可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥品讓醫師或藥師知道，才

可做最好的評估。請不要讓其他人
使用您的藥物。

佛教慈濟醫療財團法人
台中慈濟醫院
Taichung Tzu Chi Hospital,
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

24

Acemetacin

病人用藥指導卡

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。



各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150
花蓮(03) 856-1825 轉 3345
大林(05) 264-8000 轉 5384
台中(04) 3606-0666 轉 3355

守護健康、守護生命、守護愛

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(04) 3606-0833
(04) 3606-0666 轉 3355

指導卡並無法詳載 **Acemetacin** 的全部資訊，如果
使用藥品有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。我們將
竭誠為您服務。

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
藥學部 關心您