

Amlodipine & Atorvastatin

◆ 商品名：

Caduet 脂脈優錠 (5 mg & 20mg/tab)

◆ 醫生為何開此藥給我？

Amlodipine & Atorvastatin適用於因有高血壓和血脂異常這兩種可矯正的危險因子併存，而使心血管危險增加的患者；或因有心絞痛為表現之冠心病(CHD)併有可矯正的血脂異常危險因子，而使心血管危險增加的患者。

有時候此藥還有用於其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆ 該如何使用此藥品？

1. Amlodipine & Atorvastatin是口服錠劑，通常一天服用一次。請遵照醫師的指示用藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
2. 未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。即使感覺症狀好轉還是要繼續服藥。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

- 請告訴醫師或藥師，您是否對 amlodipine、atorvastatin或其他藥品過敏。
 - 請告知醫師與藥師您正在使用的藥品（包含處方藥或非處方藥、天然滋補品、維他命劑），特別是可能引起血壓升高的非處方藥(包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬 (Ibuprofen) 或類似的止痛藥、某些天然草藥或補充劑等)、 cyclosporine、gemfibrozil、telaprevir及ritonavir。
 - 請告知醫師與藥師您目前或曾有過的疾病，特別是肝臟疾病或肝臟酵素偏高。
- 使用期間，
- 告訴牙醫、外科醫師和其他醫師，您正在使用此藥。
 - 避免陽光日曬。可使用防曬乳液、穿防曬衣物。強光可能引起不適，可戴太陽眼鏡。
 - 避免或限制飲酒量，一天不可超過 3 杯。飲酒過量可能增加罹患肝臟疾病的危險。避免與葡萄柚(汁)併服。
 - 為降低頭暈或昏厥的機率，坐姿或躺姿幾分鐘後應非常緩慢地站起。爬樓梯時須小心。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

儘可能在您想起時立刻補服，若您距下次服藥時間不足12小時，則跳過錯過的劑量，按您的常規用藥時間表服藥。不要為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

雖然此藥導致的副作用並不常見，但還是可能發生。

- 若有以下的症狀發生，症狀嚴重的情形或無法消除時，請儘快通知您的醫師：腹瀉或稀便、眩暈、噁心、流鼻水、喉嚨痛、感覺疲倦或虛弱、無法入睡。
- 若您有下列任何一種症狀，請立刻就醫：過敏(如出疹、蕁麻疹、發癢)或嚴重過敏(如胸口或喉嚨緊繃、難以呼吸或說話、嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹)、肝臟問題症狀(尿色深、感到疲倦、沒有飢餓感、糞便顏色不深、嘔吐或者皮膚眼睛泛黃)、肌肉僵硬、顫抖或肌肉動作異常、劇烈的關節痛、嚴重眩暈或失去知覺、胸痛胸悶、心跳異常(過速或過緩)、記憶問題或喪失記憶、身體一側的力氣變得比另一側大、說話或思維困難、平衡感改變、視力變化等。

- 使用此藥可能引起極嚴重的肌肉問題，也可能導致腎臟疾患。若您出現肌肉疼痛或有非常疲倦、虛弱或發燒情形，請告知您的醫師。

守護健康、守護生命、守護愛



◆此藥儲存時的條件為何？

將藥品存放於原包裝中並置於小孩拿不到的地方。本藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度和直接的陽光照射。過期或不再需要的藥品應丟棄。將藥錠從錫箔片裡取出，收集至夾鏈袋中，可隨一般垃圾清除。

◆我還應知道什麼其他資訊？

要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查來確定您對於本藥的反應。不要讓任何人服用您的藥品。

◆(準備)懷孕婦女注意事項：

此藥可能會傷害腹中胎兒。在服用此藥期間，採用您信任的避孕方法來避孕。若您已懷孕或計劃準備懷孕，就診時請務必告知醫師（孕婦用藥等級：X）。如您正以母乳餵哺幼兒，也請告知醫師。

指導卡並無法詳盡 **Amlodipine & Atorvastatin** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。



靜思小語：
付出當下，福已在其中。

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150
花蓮(03) 856-1825 轉 3345
大林(05) 264-8000 轉 5384
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

病人用藥指導卡

Amlodipine & Atorvastatin (Caduet[®]) 脂脈優錠

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(02)6628-9779 轉
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您