

Aspirin

作用：

Aspirin治療疼痛、發燒、關節炎與其他發炎；也用來降低心臟病的危險。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵照醫師指示按時服用。
- ◆ 與大量開水一起服用。
- ◆ 將藥物存放在室溫，避光的地方，遠離熱源及濕氣。
- ◆ 藥物放置處應遠離兒童。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果已接近下一次服藥時間，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 一般狀況下aspirin可以與食物與其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥物讓醫師知道才可做最好的評估。
- ◆ Aspirin可能引發胃出血，酒精會加重症狀產生，服藥期間請避免喝酒。
- ◆ 如您正在服用抗凝血劑如wafarin (Coumadin[®])，probenecid，methotrexate，ticlopidine (Ticlid[®])，dipyridamole (Persantin[®])或類固醇等藥物，請事先告知醫師。

醫療提示：

- ◆ 假如您有氣喘、腎臟疾病或潰瘍等胃腸道疾病，請於服藥前告知您的醫師。
- ◆ 請您告知醫師您正在懷孕或哺乳。
- ◆ 服用aspirin可能影響部分尿糖檢驗值。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：嚴重胃痛、瘀血或嘔吐物有咖啡色塊狀物、便血或尿血、蕁麻疹、皮膚起紅疹、搔癢、眼皮或臉腫大、哮喘或呼吸困難、耳鳴、嚴重的頭昏與困倦。
- ◆ 假如您發生下列比較不具重要性的副作用，可告知醫師：胃不舒服、心口灼熱。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～