

"信隆" 乙醯水楊酸錠

Aspirin Tablets "Shinlon"

【成分】 每錠含

有效成分及含量：Acetylsalicylic acid.....300 mg

其他成分(賦形劑)：Corn Starch、Dried Starch、Hydroxypropyl Cellulose High、Talc

【用途(適應症)】 退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二)有蠶豆症的人。
 - (三)懷孕 28 週以上的婦女。
 - (四)18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一)成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。
 - (二)有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一)孕婦、可能懷孕及哺乳婦。
 - (二)曾有消化性潰瘍的人。
- 四、其他使用上注意事項：
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量。
 - (四)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。

【用法用量】

年 齡	每 日 用 量
成人及 18 歲以上	(1)每次 1 錠，發燒或需要時服(使)用，若症狀持續，則每 4 至 6 小時可重複服(使)用。每 24 小時內不可超過 5 次。 (2)飯後半小時內服用為宜。
18 歲以下	請勿使用

【警 語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副 作 用
皮 膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振、腸胃不適、胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴
其 他	出血傾向、氣喘

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)服用本藥三天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

【包 裝】 2~1,000 錠塑膠罐裝

【類 別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲 存】 25℃以下，避光儲存

【諮詢專線】 0800-005711

內衛藥製字第 011693 號



信隆藥品工業股份有限公司
Shinlon Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd.
台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號

內衛藥製字第011693號

"信隆" 1000Tabs

乙醯水楊酸 300mg 錠

ASPIRIN Tablets "Shin Lon"

SHINLON SPC 信隆 藥品

信隆藥品工業股份有限公司
Shinlon Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.
台灣·台南市仁德區中正路三段269號

藥物資訊

【有效成份及含量】每錠含 Acetylsalicylic acid.....300mg
其他成分(賦形劑)：Com Starch, Dried Starch, Hydroxypropyl Cellulose High, Talc

【用途(適應症)】退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【不可使用族群】1.曾因本藥成分引起過敏的人。
2.有腎豆症的人。 3.懷孕28週以上的婦女。
4.18歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

【用法用量】

成人及18歲以上	(1)每次1錠，發燒或需要時服(使用)，若症狀持續，則每4至6小時可重複服(使用)，每24小時內不可超過5次。 (2)飯後半小時內服用為宜。
18歲以下	請勿使用

【類別】醫師藥師藥劑生指示用藥

【諮詢專線】0800-005711

LOT:
EXP:

4710680400569




【品名】"信隆" 乙醯水楊酸錠

【用途(適應症)】退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【用法用量】

成人及 18 歲以上：(1)每次 1 錠，發燒或需要時服(使用)，若症狀持續，則每 4 至 6 小時可重複服(使用)。每 24 小時內不可超過 5 次。
(2)飯後半小時內服用為宜。

18 歲以下：請勿使用。

【藥品劑型及形狀】白色扁圓形錠劑，正面有盾牌、001 字樣，反面有一刻痕。

【諮詢電話】0800-005711