

## Fluconazole

### ◆成分劑量：

Fluconazole 150mg/cap

### ◆藥品作用：

Fluconazole 可破壞黴菌細胞內 Cytochrome P450 酶，使黴菌細胞膜形成過程受阻，進而減弱或完全失去黴菌感染作用，可治療念珠菌局部或全身感染、囊球菌感染、預防後天免疫缺乏症候群病人的黴菌感染。

### ◆該如何使用此藥品？

醫師將依據不同感染症調整用藥劑量及療程。請確實依照醫師指示服用，完成服藥療程，勿自行停藥。

### ◆忘記服藥時該怎麼辦？

若您的醫師請您定時服用，儘可能在您想起時立刻補服；若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍藥量。

### ◆使用此藥品須注意什麼事項？

- 曾經對 Fluconazole 過敏者，請勿服用。
- 服藥期間應避免喝酒。
- 請告知醫師或藥師您正在服用的藥品(包括處方藥及非處方藥)，以及您目前或曾有的疾病，例如：肝、腎疾病等。醫師將依照您的情況做適當調整。
- 懷孕或授乳期，請事先告知醫師。

### ◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

此藥品於一般劑量下使用，通常無特殊副作用，若是有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請儘快通知您的醫師：

- 胃部不適、便秘、下痢、頭痛、暈眩、疲勞、沒有食慾。
- 皮膚發疹、發癢、嘔吐、眼睛或皮膚發黃、尿液顏色加深、糞便變白。

### ◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩

拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

### ◆是否有其他我應該知道的資訊？

一般狀況下本藥品可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥品讓醫師或藥師知道，才可做最好的評估。請不要讓其他人使用您的藥物。

佛教慈濟醫療財團法人

台中慈濟醫院

Taichung Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

94

Fluconazole

病人用藥指導卡

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。



各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

台中(04) 3606-0666 轉 3355

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(04) 3606-0833

(04) 3606-0666 轉 3355

指導卡並無法詳載 **Fluconazole** 的全部資訊，如果  
使用藥品有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。我們將  
竭誠為您服務。

守護健康、守護生命、守護愛

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院  
藥學部 關心您