



“杏輝”

G.M.P. 藥品

# 樂多 糖漿666公絲/公撮(拉特樂斯)

## LACTUL Syrup 666mg/ml “Sinhpar” (Lactulose)

— 緩瀉劑 —

Lactulose是一種雙醣類，由 Galactose 和 Fructose 組合而成，它幾乎不被消化道吸收，且不具熱能，在被腸內細菌分解後形成低分子量的有機酸 acetic acid、lactic acid，能酸化腸內容物，當腸內容物的酸度大於血液時，會將血液中的NH<sub>3</sub>轉移至腸道中形成 NH<sub>4</sub><sup>+</sup>，並限制其再吸收回血液中，而導致緩瀉作用，並可治療及預防 Portal-systemic encephalopathy。以Lactulose治療病患時，通常可發現其蛋白質耐受性會增高。

成份：每 mL 含：

Lactulose.....666mg

適應症：患病期慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷。

用法用量：

- 1.治療便秘：成人一天15~30mL，需要時可增加到60mL每天，24~48小時內會恢復正常的腸蠕動。
  - 2.治療預防 Portal-systemic encephalopathy：
    - 口服：成人：一日三~四回，一回30~45mL
    - 嬰兒：一日劑量，2.5~10mL
    - 小孩：一日劑量，40~90mL
    - 持續劑量則依個人的反應，再作增減。
- 直腸灌腸：本品300mL以700mL之水或生理食鹽水稀釋，放置30~60分鐘。

注意事項：

- 1.因本品含少量的galactose及lactose所以糖尿病患及半乳糖血症(galactosemia)病患，須小心謹慎給藥。
- 2.本品可使用於孕婦及小孩，但嬰兒在使用Lactulose時可能會引起低血鈉症(hyponatremia)及脫水症狀。
- 3.本品不具成癮性。
- 4.用藥過量時可能產生脫水、低血鉀症、低血鈉症、噁心、嘔吐等症狀。
- 5.避光及室溫(15~30°C)貯存。
- 6.在室溫良好條件貯存下，顏色變深並不影響療效。
- 7.長期置於30°C以上或光直射時，易變成極深色及混濁，當此現象發生時，請勿再使用；長期置於冷凍溫度時，呈半固體狀、變稠、不易倒出，但恢復至室溫時，即可恢復原狀，不影響療效。
- 8.請置於孩童不易取得處。
- 9.如覺口味不適時，可與果汁、白開水、牛乳混合後使用。
- 10.用Lactulose治療之病患，需要作電燒處置或作大腸直腸鏡檢時有理論上的危險性；由於若氫氣累積到相當濃度時，電氣火花可能會引發爆炸反應，因此可充氣CO<sub>2</sub>作為額外安全處理。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第039701號

G-5196號

包裝：30~4000公撮塑膠瓶裝。



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號  
84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN  
服務專線：(0800)021053-015151 web site：http://www.sinphar.com

10-190-01