

芙琳亞錠 15公絲

Folina Tablets 15mg

(Folate 15mg)

【成分】

每錠含Calcium Folate · 5H₂O 19.06mg(約等於Folate 15.0mg)

【適應症】

超量使用葉酸拮抗劑時，消滅其毒性及抵消其作用、治療因斯潑盧營養缺乏、妊娠及其幼齡等引起之巨初紅血球性貧血。

【使用方法、劑量】(本藥須由醫師處方使用)

- 高劑量methotrexate使用後的救助法

通常於methotrexate開始輸注給藥後8~24小時內施予Folina救助療法，每次口服15mg(相當於10mg/m²)；每6小時一次，連續給予10個劑量。每天至少需檢測一次血清肌酸酐(creatinine)和methotrexate的血液中濃度。除施予Folina救助療法外，並給予大量飲水或靜脈輸液及鹼化尿液使尿液之pH大於或等於7.0，直至methotrexate的濃度小於 5×10^{-8} M (0.05 micromolar) 為止。

- 治療葉酸缺乏症

小於12歲之孩童：每天每公斤給予0.25mg(0.25mg/kg/day)成人每天：10~20mg，以每日口服一錠Folina(1 tablet/day)最常使用。

【禁忌症】

Folina tablet不適用於治療因缺乏維他命B12所引起之惡性貧血或其它巨紅血球性貧血。

【警語】

1. 為了減輕methotrexate的臨床毒性時，Folina tablet不可與methotrexate同時給藥，否則會喪失methotrexate的療效。但若與其他之葉酸拮抗劑如Trimethoprim及Pyrimethamine併用時並不會抑制其抗菌活性。
2. 若病患有腹水、胸膜滲出液、腎功能障礙或Hydration不夠時會延遲methotrexate排出。如上述情況發生時，應考慮增加Folina劑量或延長治療時間。若建議劑量高於口服使用許可劑量應改以靜脈注射給藥。
3. Calcium Folate可能會增加Fluorouracil的毒性。

【藥物交互作用】

1. 大量的Folic acid可能會拮抗Phenobarbital, Phenytoin和Primidone藥品之抗癲癇作用；使病童發作次數增加。
2. 高劑量的Calcium Folate可能降低Methotrexate髓鞘內投子的效果。
3. Calcium Folate可能增加Fluorouracil的毒性。

【懷孕】：致畸胎作用

懷孕危險級數"C"。

尚未有動物的生殖影響研究報告。懷孕婦女投予Calcium Folate對胎兒是否造成傷害或對生育力的影響未知。

【授乳】

尚未知是否會分泌於乳汁中，但基於許多藥物皆會分泌於乳汁，建議授乳婦應謹慎使用。

【副作用】


不良反應很少見，但曾有過敏反應 [包括：類過敏性反應 (anaphylactoid reactions)、蕁麻疹 (urticaria)] 及注射給藥後發生發熱反應的報告。

【過量】

應停止給藥。

【包裝】 2~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】 儲藏於室溫(15~30°C)下，請置於孩童無法取得之處。

【製造廠】  台灣東洋藥品工業股份有限公司

【廠址】 桃園縣中壢市中華路一段 838 號

【公司地址】 台北市民權東路三段170號4樓

【電話】 0800086288

2IS01240(A02)