

Megestrol (Megest[®]，麥格斯)

作用：

Megestrol 用來治療乳癌或子宮內膜癌；也用來增加愛滋病或癌症病人的食慾，預防體重下降。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵照醫師指示按時服用，不要過量。
- ◆ 此藥治療癌症，至少持續服用 2 個月以上，才開始發揮效果。
- ◆ 將藥物存放密閉容器中，放置於室溫避光處，遠離濕氣與熱源。
- ◆ 藥物放置處應遠離兒童。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果已接近下一次服藥時間，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 一般狀況下 megestrol 可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥物讓醫師知道才可做最好的評估。

醫療提示：

- ◆ 假如您的身體容易產生血塊、哺乳或糖尿病，請通知醫師。
- ◆ 服藥期間請採用有效的避孕措施，因為此藥會對懷孕中的胎兒造成傷害。一旦發現懷孕，要立刻通知醫師。
- ◆ 此藥若長期服用，可能增加得到其他癌症的危險性。
- ◆ 此藥可能讓食慾增加，使體重上升。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：
口渴、排尿次數增加、噁心嘔吐、虛弱、頭昏、小腿紅腫熱痛、滿月臉、嚴重頭痛、口齒不清、視力模糊、突發性呼吸急促、胸痛。
- ◆ 假如您發生下列比較不具重要性的副作用，可告知醫師：
月經週期不規則出血、消化不良、起紅疹、勃起困難或難以持久、失眠，

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～