

Magnesium Oxide (口服)

作用：

Magnesium Oxide可緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請確實按照醫師處方指示服用。
- ◆ 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣，不需冷藏。
- ◆ 不可將藥分給小孩子服用，也不可以分送給他人服用。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果已接近下一次服藥時間，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 於服藥前先詢問您的醫師或藥師，是否可與其他藥物(包括成藥)、維他命和草藥併用。
- ◆ 制酸劑不得併用其他藥品。
- ◆ 飯後1~3小時和睡前服用本藥可得到最大的效果。

醫療提示：

- ◆ 除非有醫師、藥師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- ◆ 除非有醫師處方，6歲以下的兒童不可服用本藥。
- ◆ 長期過量使用本藥會造成血清鉀濃度降低。
- ◆ 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師、藥師。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：
暈眩、頭昏眼花、心跳不規則、心情或精神改變、異常疲倦或虛弱。
- ◆ 假如您發生下列比較不具重要性的副作用，可告知醫師：
腹瀉、噁心、嘔吐、腹部痙攣。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～