

"榮民"氧化鎂錠250毫克

Magnesium Oxide Tablets 250mg "VPP"

衛署藥製字 第 013382 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠含

Magnesium Oxide 250 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Talc, Lactose Monohydrate Spray Dried, Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide.

2 用途(適應症)

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多；軟便。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 消化道潰瘍的人。

3.2.3 有腎臟疾病的人。

3.2.4 闌尾(盲腸)發炎或有其症狀的人(服用本藥可能增加胃腸道穿孔或破裂的風險，使病況變得複雜)。

3.2.5 胃腸或直腸出血的人。

3.2.6 潰瘍性結腸炎、慢性腹瀉(服用本藥可能會增加腹瀉)、憩室炎的人。

3.2.7 有結腸或迴腸造口的人。

3.2.8 有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。

3.2.9 高分泌失常，如：十二指腸潰瘍、Zollinger-Ellison Syndrome、多發性內分泌腺瘤和全身性著色性蕁麻疹的病人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 併用其他瀉劑或與其他藥品併用時 [如：Cimetidine、Dicumarol、Digoxin、Isoniazid、Levodopa、Phenothiazines (尤其是Chlorpromazine)、Calcifediol、Calcitriol、

Potassium Phosphate、Sodium Phosphate、Chlordiazepoxide、Diazepam、Sodium Polystyrene Sulfonate Resin (SPSR)、Tetracycline]。

3.3.3 連續使用一星期以上。

3.3.4 對於牛奶或乳製品耐受度低者。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

3.4.5 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

3.4.6 本藥單位劑量之酸中和能力為12.3 mEq。

3.4.7 本藥單位劑量之鎂含量為12.4 mEq。

3.4.8 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。

3.4.9 本藥使用期間可能會有腹瀉產生。

3.4.10 長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。

3.4.11 雖有報告指出孕婦長期高劑量使用本藥會使新生兒產生伴隨嗜睡、肌肉張力降低、心臟血管和呼吸功能不全之高鎂血症，但於懷孕中期和後期只要避免長期高劑量，一般認為仍可安全使用。

3.4.12 如果在規律服藥中忘記服藥，且發現時尚未超過兩次服藥時間的中點，則可以補服一次劑量；若已接近下次服藥時間，或發現時已超過兩次服藥時間的中點，則不必補服，照下次服藥時間用藥即可，且下次服藥時不可服用加倍劑量。

3.4.13 飯後1~3小時和睡前服用本藥(尤其是潰瘍病人)可使藥物發揮最大的治療效果。

3.4.14 服用本藥期間建議限制鈉的攝取量。

4 用法用量

| 年齡 | 制酸劑 | 瀉劑 |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| 成人及12歲以上 | 每次1錠，一天3~4次，或需要時服用，應嚼碎後吞服。 | 一日1~3次，1次1~2錠，一日以3次為限。 |
| 6歲以上未滿12歲 | 適用成人使用量之1/2。 | 適用成人使用量之1/2。 |
| 3歲以上未滿6歲 | 適用成人使用量之1/4。 | 適用成人使用量之1/4。 |
| 未滿3歲 | 請洽醫師診治。 | 請洽醫師診治。 |

瀉劑：服用間隔須4小時以上，於飯前(或隨餐)服用。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

| 身體部位 | 副作用 |
|------|--|
| 胃腸道 | 腹瀉、噁心、嘔吐、嚴重腹痛。 |
| 其他 | 1. 發疹等過敏症狀。 暈眩、頭昏眼花、心跳不規則、心情或精神改變、異常疲倦或虛弱(可能為高鎂 2. 血症或其他電解質不平衡)。 |

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況發生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

5.2.3 使用一星期後無效。

5.2.4 腹瀉持續不止或更嚴重。

5.2.5 有血便及自發性腸道出血狀況。

6 包裝

6~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

7 儲存方式

本品應包裝於緊密容器，貯於25°C以下乾燥處所。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

9 藥理作用

9.1 制酸劑 - 本藥並不直接影響胃酸的分泌，而是藉化學性的酸鹼中和反應，緩衝過多的胃酸，進而緩解胃酸過多的症狀。

9.2 本藥口服後，約只有10%鎂(Magnesium)會被腸道吸收。

9.3 本藥由腎及糞便排泄，約15~30%所形成的鹽類會被腸道吸收並由腎臟排泄。

製造廠

榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路3段447號

藥商

榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路3段447號