

Modafinil

◆成分劑量：

Modafinil 200mg/tab

◆藥品作用：

Modafinil 是一種中樞神經興奮劑，主要用來改善發作性睡病，減輕在白天時的困倦或虛弱感；此藥亦可治療其他病症，請詢問醫師或藥師可獲得更多相關資訊。

◆該如何使用此藥品？

此藥通常一天服用一次，會在早上後服用。Modafinil 可能會有習慣性，請不要自行增減劑量或服用次數。未與醫師討論前，請勿擅自停藥；若有任何疑問都可以詢問醫師或藥師。

◆忘記服藥時該怎麼辦？

若您的醫師請您定時服用 Modafinil，儘可能在您想起時立刻補服；若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍藥量。

◆使用此藥品須注意什麼事項？

- 請告訴醫師及藥師，您是否對 Modafinil 或其他藥物過敏。
- 請告訴醫師及藥師您目前服用的藥物(包括處方藥或成藥)，特別是抗凝血劑、抗憂鬱藥、抗黴菌藥、抗癲癇藥、單胺氧化酶抑制劑、鎮靜藥以及 Rifampin。未經醫師同意，不可使用任何新藥。
- 應告知醫師是否曾有下列病史：酗酒、藥物濫用、心血管、肝腎疾病，或是在服用中樞神經興奮劑後，有胸痛、心悸現象。
- 服用 Modafinil 會降低口服避孕藥的效果。請在停用口服避孕藥一個月後，再改用其他形式之避孕方式。
- 在服藥期間會有思考及判斷力的改變，在確定藥物對您的影響變化後才可以駕車或是操作機械。
- 不要喝酒精性飲料，酒精會增強此藥造成的嗜睡和鎮靜作用。

◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

若以下症狀嚴重或無法消除，請儘快告知醫師：

- 上腹痛
- 頭痛
- 神經緊張
- 難以入睡或持續困倦
- 虛弱
- 憂鬱
- 腹瀉
- 流鼻水
- 口乾
- 食慾減低
- 嘔吐
- 頸部僵硬或疼痛
- 混亂或健忘

若有下列症狀，請立刻通知醫師：

- 胸痛
- 快速或不規則的心跳
- 呼吸短促
- 皮疹或蕁麻疹
- 發燒、喉嚨痛、寒顫或其他類似感染的徵狀。

Modafinil 仍可能引起其他的副作用，在服藥期間若有不尋常的問題請儘速聯絡您的醫師。

◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

◆是否有其他我應該知道的資訊？

請定期回診且最好將您服用的其他藥品讓醫師或藥師知道，才可做最好的評估。請不要讓其他人使用您的藥物。

佛教慈濟醫療財團法人
台中慈濟醫院
Taichung Tzu Chi Hospital,
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。

各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

台中(04) 3606-0666 轉 3355

守護健康、守護生命、守護愛

32

Modafinil

病人用藥指導卡



服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(04) 3606-0833

(04) 3606-0666 轉 3355

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
藥學部 關心您

指導卡並無法詳載 **Modafinil** 的全部資訊，如果

使用藥品有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。

我們將竭誠為您服務。