

以詢問醫師或藥師。

Nystatin

◆成分劑量：

Nystatin 0.5 MU/膠囊

Nystatin 陰道錠 0.1MU /錠

Nystatin 懸液用粉劑 0.1 MU/ml,
24ml/bt

◆醫師為何開此藥給我？

Nystatin 用於治療皮膚、口腔、陰道或消化道的白色念珠菌感染。本藥對於感冒、流行性感冒與病毒感染無治療功效。此藥亦可治療其他病症，詢問醫師或藥師可獲得更多相關資訊。

◆該如何使用此藥物？

- 一天使用 1 至 2 顆膠囊，一天使用 3 至 4 次，臨床症狀消失後仍需使用 48 小時以上，以防復發。
- 若需要泡製成藥水，使用方法如下：取 10 顆膠囊剝開取出粉末，並加入到 250cc 的水，混合均勻後即可使用。
- 懸液用粉劑泡製成藥水使用方法如下：藥品加水 23cc 泡製，混合均勻後即可使用。
- 請確實依照醫師指示服用，並不要自行增減藥量，若有任何疑問都可

◆忘記服藥時該怎麼辦？

- 若您的醫師請您定時服用 Nystatin，儘可能在您想起時立刻補服，若已接近下次吃藥的時間(超過 12 小時)，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍藥量。假使超過兩天忘記服藥，請聯絡醫師詢問該如何處理。

◆使用此藥前需注意什麼事項？

- 請告訴醫師及藥師，您是否對 Nystatin 或其他藥物過敏。
- 請告訴醫師及藥師您目前服用的藥物(包括處方藥或成藥)及維他命。

◆服藥過量時該怎麼辦？

如果當事者服用藥物過量、暈倒或呼吸停止，請立刻撥打 119。

◆飲食上需要特別注意什麼？

三餐均衡正常飲食即可。

◆(準備)懷孕婦女注意事項：

如果您計畫懷孕，或在服藥期間懷孕(或哺乳)，請立即連絡醫師。

◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

雖然 Nystatin 引起的副作用並不常見，但仍可能發生。若以下症狀嚴重或無法消除，請儘快告知醫師：

- 皮膚發疹
- 刺激感
- 灼熱感

若有下列症狀，請立刻通知醫師：

- 皮膚發疹
- 腹瀉
- 胃部不適
- 胃痛

◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

◆是否有其他我應該知道的資訊？ 請不要讓其他人使用您的藥物。

42

佛教慈濟醫療財團法人

台中慈濟醫院

Taichung Tzu Chi Hospital,
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

Nystatin

病人用藥指導卡

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。



各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

台中(04) 3606-0666 轉 3355

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(04) 3606-0833

(04) 3606-0666 轉 3355

指導卡並無法詳載 **Nystatin** 的全部資訊，如果
使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我
們將竭誠為您服務。

守護健康、守護生命、守護愛

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
藥學部 關心您