

“派頓”弛刻達膠囊
SKETA Capsules”Patron”

【成分】：每膠囊中含有：

Chlorzoxazone-----250mg

Acetaminophen-----300mg

【賦形劑】：Magnesium stearate.

#0 Blue-Yellow No.Patron 610 Capsules：

Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water,
Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide, Tartrazine.

【作用及特長】：

- (1) Chlorzoxazone 是一種肌肉遲緩劑，其作用點在脊椎和腦下皮膚，它對產生骨骼肌痙攣的多神經節反射弧，具有抑制作用而使肌肉放鬆。
- (2) Acetaminophen 是一非柳酸鹽類之鎮痛劑，對於骨骼肌的疼痛症，有優良的療效，且藥效持久，鮮少副作用。

【適應症】：

關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、肌肉之痙攣、強直及疼痛、尖酸、運動後之酸痛。

【用法用量】：

通常 1 次 1 粒，限 1 日 3 次，盡量避免空腹時使用，服用間隔為 4 小時以上。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

- (1) 禁忌：過敏症之既往歷患者。
- (2) 慎重投與：
 - a. 肝腎障害患者。
 - b. 懷孕中投與時其安全性尚未確立，孕婦或可能懷孕婦女需權衡治療上之有益性極危險性慎重投與。
- (3) 副作用：
 - a. 過敏症：發疹、瘙癢感等過敏症狀出現時，應即中止服用。
 - b. 思睡、眩暈、搖晃、倦怠等症狀出現時，應減量或休藥。
 - c. 會引起肝腎機能障害，應仔細觀察。
 - d. 偶有噁心、嘔吐、胸悶、食慾不振、腹瀉、便秘等症狀。
 - e. 偶有血小板減少症、顆粒狀減少症，需仔細觀察。

【警語】：

- 1、肝毒性：
 - (1) 使用 acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。

- (2) 過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了
- (3) 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

- 2、與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

3、過量：

- (1) 服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
- (2) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
- (3) Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀，可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

4、過敏/過敏性反應：

上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療良之過敏反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。

曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

- 5、嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告中，如急性全身發疹性膿疱病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥品。

【包裝】：6-1000 錠瓶裝、鋁箔盒裝

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨東路 50 號 TEL：(07)6216126