

Penicillin V potassium

◆ 商品名：

Penicillin V 400000U/錠 配尼西林V片

◆ 醫生為何開此藥給我？

Penicillin V potassium用於治療細菌感染。此藥也可能用於治療其它病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆ 該如何使用此藥品？

1. Penicillin V potassium為口服錠劑，通常每6~8小時服用一次，空腹(餐前1小時或餐後2小時)服用。若藥品引起胃部不適，則改與食物同時服用。
2. 請遵照醫師指示用藥，未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。若持續服用超過指示的期間，可能會發生二次感染。若對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 penicillin V potassium、tartrazine、其它 penicillin或此藥的任何其他成

分或其他藥品過敏。

2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥品，包含非處方藥、營養補充品、維他命及草藥，特別是其它抗生素、warfarin、atenolol、aspirin、口服避孕藥、probenecid及非類固醇抗發炎藥如naproxen或ibuprofen。
3. 若您對此類藥物、任何藥物、食物或其他物質過敏。告訴醫師您的過敏情況與症狀，例如臉部，嘴唇，舌頭或喉嚨腫脹、出疹、蕁麻疹、發癢、呼吸短促、喘鳴、咳嗽或其他過敏現象。
4. 若您將要進行手術(包含牙科手術)，請告訴牙醫師、外科醫師和其他醫師，您正在使用本藥。
5. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病及健康問題，如：腎臟或肝臟疾病、過敏、氣喘、血液相關疾病、結腸炎、胃部不適或花粉症。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

盡可能在您想起時，立刻補服一個劑量；但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

雖然 penicillin V potassium導致的副作用並不常見，但還是可能發生。

- 若是有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請盡快告知您的醫師：噁心、嘔吐、腹瀉或稀便。
- 若您有下列任一症狀，請立刻就醫：嚴重的皮膚過敏反應、異常瘀傷或出血、胃痛或痙攣、嚴重稀便、水便或甚至血便。

◆ 此藥儲存時的條件為何？

將藥品存放於緊閉容器中並置於兒童拿不到的地方。本藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(例如：浴室)和直接的陽光照射。過期或不再需要的藥品應丟棄。將錠劑收集至夾鏈袋中，可隨一般垃圾清除。

◆ (準備)懷孕、哺乳婦女注意事項：

若您已懷孕或計畫懷孕、在服藥期間懷孕或正在哺乳，就診時請告知醫師(孕婦用藥等級：**B**)。

◆ 我還應知道什麼其他資訊？

1. 避孕藥丸和其他利用荷爾蒙的避孕方法可能無法有效防止懷孕。服用該藥時應再使用其他形式的避孕措施，例如保險套。
2. 定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查(如：血液檢驗)來確定您對於本藥的反應。

3. 不要讓任何人服用您的藥品。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡

靜思小語：
人生能被人需要，能夠有份功能，為
人付出，才是最幸福的人生。

**Penicillin V
potassium
(Penicillin V®)
配尼西林 V 片**

指導卡並無法詳盡 **Penicillin V potassium**
的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢
醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150
花蓮(03) 856-1825 轉 3345
大林(05) 264-8000 轉 5384
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(02)6628-9779 轉
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您