

Pitavastatin

◆ 商品名：

Pitator 2mg/錠 (必抑脂)

◆ 醫生為何開此藥給我？

服用 Pitavastatin 且合併減重飲食與運動，可降低血中膽固醇和三酸甘油酯的量。減少血中膽固醇有助於預防心臟疾病、心絞痛、中風和心臟病發作。此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊

◆ 該如何使用此藥品？

Pitavastatin 是口服錠劑，通常一天服用一次，固定時間服用，可隨食物或不隨食物服用。請遵照醫師的指示用藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師，未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數，即使覺得症狀有改善，仍須繼續服藥，未經醫師同意請勿擅自停藥。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 pitavastatin 或其他藥品過敏。

2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥品 (包含非處方藥、營養補充品、維他命及草藥)，特別是 cyclosporine、erythromycin、其它降血脂藥，如：niacin、fenofibrate、gemfibrozil；rifampin、atazanavir、ritonavir 及 wafarin。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：是否有肝臟、腎臟、甲狀腺疾病、肌肉疼痛或無力、低血壓或癲癇。
4. 如果您將要進行手術 (包含牙科手術)，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用 pitavastatin。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

儘可能在您想起時立刻補服，若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，並繼續按照原本的用藥方式。不要為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

Pitavastatin 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若以下症狀嚴重或無法消除，請儘快告知醫師：背痛、便秘、腹瀉、記憶力減退、健忘、意識混亂。

若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：肌肉疼痛、壓痛、虛弱無力、發燒、噁心、

極度疲勞、不正常的瘀青或出血、精神不濟、食慾不振、腹部疼痛、皮膚或眼睛發黃、尿液顏色變深、類流感症狀、皮疹或搔癢。

◆ 此藥儲存時的條件為何？

將藥品存放於緊密容器中並置於小孩拿不到的地方。儲存在室溫，遠離高溫、高溼度 (不要放置於浴室)、避免直接的陽光照射。過期或不再需要的藥品應丟棄。將錠劑從錫箔片裡取出，收集至夾鏈袋中，可隨一般垃圾清除。

◆ 懷孕、哺乳婦女應注意甚麼？

1. 若您已懷孕或計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。服用本藥時需避孕，若您在服藥期間懷孕，請立即通知醫師，藥品可能會傷害胎兒。(孕婦用藥等級：X)。
2. 服用 pitavastatin 期間，請勿哺乳。

◆ 在飲食上有什麼要特別注意？

1. 盡量攝取低膽固醇及脂肪的食物。
2. 遵循醫師及營養師給予的飲食及運動建議。
3. 請告知醫師您的飲酒習慣，因酒精會加重此藥的副作用，服用此藥期間請勿飲酒。

◆我還應知道什麼其他資訊？

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查來確定您對於本藥的反應，尤其是當您有出現肝損傷的症狀。
2. 不要讓任何人服用您的藥品。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡

靜思小語：

說人是非者，必是是非人；身處團體中，應多去發現別人的優點。

Pitavastatin
(Pitator[®])

必抑脂膜衣錠

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(02)6628-9779 轉
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

指導卡並無法詳盡 **Pitavastatin** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。

台北慈濟醫院藥學部 關心您