

# Propafenone

## ◆成分劑量：

Propafenone 150 mg/膜衣錠

Propafenone 225 mg/緩釋膠囊

## ◆藥品作用：

Propafenone 用來治療心室性心搏過速、上心室性心搏過速及 W-P-W 症候群。詢問醫師或藥師可獲得更多相關資訊。

## ◆該如何使用此藥品？

請確實依照醫師指示服用，劑量須依個人情況給予調整。一般 70 公斤左右成人，建議劑量為每天 450-600mg，分二至三次服用；若體重較輕，每日劑量會斟酌減少。

## ◆忘記服藥時該怎麼辦？

若您忘記服用，儘可能在您想起時立刻補服；若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量，而服用雙倍藥量。假使超過兩天忘

記服藥，請聯絡醫師詢問該如何處理。

## ◆使用此藥品須注意什麼事項？

- 1.請告訴醫師及藥師，您是否對 Propafenone 或其他藥物過敏。
- 2.請告訴醫師及藥師您目前服用的藥物(包括處方藥或成藥)。
- 3.如有腎臟及肝臟疾病史也應告知醫師。
- 4.Propafenone 經由 Cytochrome P2D6 系統代謝，已知會抑制或誘導此酵素的藥物，也會影響 Propafenone 的藥效。
- 5.葡萄柚會加強藥品的作用；服藥期間，請勿食用葡萄柚(汁)。
- 6.如果您計畫懷孕，或在服藥期間懷孕(或哺乳)，請立即連絡醫師。
- 7.Propafenone 可能會引起視力模糊、眩暈、疲勞與姿態性低血壓，可能會影響到反應速度，而減弱個人開車或操作機械的能力。

## ◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

雖然 Propafenone 引起的副作用並不常見，但仍可能發生。

- 1.過敏反應：如臉手搔癢、水腫、蕁麻疹、口腔喉嚨腫脹刺痛、胸悶、呼吸困難、焦慮、精神混亂、肝膽異常、視力模糊，請停藥，並立即就醫。
- 2.若症狀嚴重：疲勞、暈眩、噁心、嘔吐、口乾、腹痛、厭食、低血壓、心跳速率下降、頭痛，請儘速就醫。

## ◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

## ◆是否有其他我應該知道的資訊？

一般狀況下本藥品可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥品讓醫師或藥師知道，才可做最好的評估。請不要讓其他人使用您的藥物。

佛教慈濟醫療財團法人

台中慈濟醫院

Taichung Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

71

# Propafenone

## 病人用藥指導卡

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。



各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

台中(04) 3606-0666 轉 3355

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(04) 3606-0833

(04) 3606-0666 轉 3355

指導卡並無法詳載 **Propafenone** 的全部資訊，如

果使用藥品有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。

我們將竭誠為您服務。

守護健康、守護生命、守護愛

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

藥學部 關心您