

Itraconazole (Icomein) 易克黴 100mg/cap

作用：

全身性或深部微菌感染、甲癬。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵照醫師指示按時服用。
- ◆ 此藥需遠離兒童，也不可以將分給他人使用。
- ◆ 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果已接近下一次服藥時間，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 假如您有在服用其他的藥，最好要讓醫師知道才可做最好的評估，包括到其他醫療院所拿的藥，所買的成藥及維他命、中草藥。
- ◆ 服藥期間避免飲用含葡萄柚汁飲料。

醫療提示：

- ◆ 全身性黴菌感染及甲癬病人使用（手指甲癬限用 6 週，足趾甲癬限用 12 週，並在各 6 及 12 個月內不得重複使用本品或其他同類藥品）。
- ◆ 如用於念珠性陰道炎，限頑固性疾病或無性經驗病人無法使用塞劑治療病人。
- ◆ 使用其他頑固性體癬：每次門診時，應註明使用日期，目前已使用週數及預定停藥日期。病人接受本品治療期間，不得併用其他同類藥品。
- ◆ 本藥禁用在懷孕(孕婦或在治療期有可能懷孕的婦女)。
- ◆ 服用本藥時應避孕，有效之避孕方法應持續至適撲諾 SPORANOX 治療結束後之經期。
- ◆ 本藥禁用在肝功能不全。
- ◆ 請遵照醫師或藥師指示使用。
- ◆ 請勿隨意停藥。
- ◆ 禁用在已知對本藥和其任何成分過敏者。

可能引起的副作用：

- ◆ 噁心、水腫、高血壓、頭痛、紅疹。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～