

Bethanechol

◆成分劑量：

Bethanechol 25 mg/錠

◆醫師為何開此藥給我？

Bethanechol 用來緩解手術、藥物或其他因素引起的排尿困難。

◆該如何使用此藥物？

此藥為口服錠劑，通常一天服用兩至四次，服藥間隔要平均。請按照處方指示小心服藥；若有任何疑問都可以詢問醫師或藥師。未經醫師指示，不可自行調整劑量或增加服藥次數。空腹服用此藥(飯前一小時或飯後兩小時)，以防止胃部不適。

◆忘記服藥時該怎麼辦？

若您的醫師請您定時服用 Bethanechol，儘可能在您想起時立刻補服；若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量，而服用雙倍藥量。假使超過兩天忘記服藥，請聯絡醫師詢問該如何處理。

◆此藥是否有其他用途？

此藥亦可治療其他病症，詢問醫師或藥師可獲得更多相關資訊。

◆使用此藥前需注意什麼事項？

- 1.請告訴醫師及藥師，您是否對 Bethanechol 或其他藥物過敏。
- 2.請告訴醫師及藥師您目前服用的藥物(包括處方藥或成藥)，特別是 Procainamide、Quinidine，治療感冒或鼻塞藥物，及維他命。
- 3.如有氣喘、膀胱感染、癲癇、高血壓、心臟方面疾病史、帕金森氏症、甲狀腺亢進，或潰瘍，請告知醫師。

◆(準備)懷孕或哺乳婦女注意事項：

如果您計畫懷孕，在服藥期間懷孕或哺乳，請立即連絡醫師。

◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

雖然 Bethanechol 引起的副作用並不常見，但仍可能發生。若以下症狀嚴重或無法消除，儘快告知醫師：

- 1.胃部不適
- 2.嘔吐

3.暈眩

4.冒汗及面潮紅

若有下列症狀，請立刻通知醫師：

- 1.呼吸短促
- 2.昏迷、不省人事
- 3.心跳緩慢(心跳小於每分鐘五十下)

◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

◆服藥過量時該怎麼辦？

如果當事者服用藥物過量、暈倒或呼吸停止，請立刻撥打 119。

◆是否有其他我應該知道的資訊？

一般狀況下本藥品可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥品讓醫師或藥師知道，才可做最好的評估。應定期回診。請不要讓其他人使用您的藥物。

佛教慈濟醫療財團法人

台中慈濟醫院

Taichung Tzu Chi Hospital,
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

70

Bethanechol

病人用藥指導卡

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。



各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

台中(04) 3606-0666 轉 3355

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(04) 3606-0833

(04) 3606-0666 轉 3355

指導卡並無法詳載 **Bethanechol** 的全部資訊，如
果使用藥品有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。我們
將竭誠為您服務。

守護健康、守護生命、守護愛

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
藥學部 關心您