

# Cephalexin

## ◆商品名：

**Cephalexin 賜福力欣 500mg/膠囊**  
**Ulexin (優力徽素) 25mg/ml,60 ml/bt**

## ◆醫生為何開此藥給我？

Cephalexin 是一種頭孢菌素類的抗生素，可以用來治療某些細菌引起的感染，例如：肺炎，骨頭、耳朵、皮膚、喉嚨及泌尿道感染。抗生素對感冒、流行性感冒或其他病毒感染可能無效。此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

## ◆該如何使用此藥品？

1. Cephalexin 有口服膠囊及口服懸液，通常每6小時(一天服用四次)或每12小時(一天服用二次)服用一次。
2. 請遵照醫師的指示用藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
3. 膠囊應整粒吞服，並配一大杯開水服

用。

4. 即使病情已改善，仍需繼續服用完所有處方的份量。未經醫師指示，請勿擅自停藥。

## ◆使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前

- 請告訴醫師或藥師，您是否對 cephalexin 或其他頭孢菌素類的抗生素，如：cephadroxil 或 cephradine, penicillin 或其他藥品有過敏的反應。
- 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥品(包含非處方藥)，特別是抗凝血劑如 wafarin, probenecid 及維他命。
- 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：是否有腎臟、肝臟疾病、大腸或胃的問題。
- 如果您將要進行手術(包含牙科手術)，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用 cephalexin。

## ◆忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

儘可能在您想起時立刻補服，若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍藥量。

## ◆此藥會造成什麼副作用？

雖然 cephalexin 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀或症狀嚴重無法消除，請盡快通知您的醫師：胃不舒服、腹瀉、嘔吐、輕微的皮膚紅疹。

若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：嚴重的皮膚紅疹、發癢、蕁麻疹、呼吸或吞嚥困難、哮喘、不正常出血或瘀青、喉嚨痛、口腔疼痛、陰道發炎。

## ◆此藥儲存時的條件為何？

- 將藥品存放於容器中並置於小孩拿不到的地方。
- 本藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和直接的陽光照射。
- 過期或不再需要的藥品應丟棄。將膠囊從錫箔片裝中取出，並收集於夾鏈袋，隨一般垃圾丟棄即可。

## ◆我還應知道什麼其他資訊？

要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查以確定您對 cephalexin 的反應。不要讓任何人服用您的藥品。若服用完 cephalexin 仍有感染症狀，請告訴您的醫師。

◆(準備)懷孕婦女注意事項：

若您已懷孕或計劃準備懷孕，就診時請務必告知醫師(孕婦用藥等級：B)。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡

靜思小語：  
付出當下，福已在其中。

# Cephalexin

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150  
花蓮(03) 856-1825 轉 3345  
大林(05) 264-8000 轉 5384  
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口  
諮詢電話：(02)6628-9779 轉  
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您

指導卡並無法詳盡 **Cephalexin** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。