

Loratadine & Pseudoephedrine

◆ 商品名：

LoraPseudo 24h SR F.C.

莫鼻卡24小時持續性膜衣錠

Loratadine 10mg & Pseudoephedrine
240mg/F.C. tab

◆ 醫生為何開此藥給我？

Loratadine及pseudoephedrine可以緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如：鼻塞、流鼻水、搔癢及流眼淚。此藥也可能用於治療其他病症，請問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆ 該如何使用此藥品？

1. 成人及十二歲以上小孩，每天一次，一次一顆。
2. 此藥為持續釋放膜衣錠，不可剝半或磨碎。
3. 請遵照醫師的指示用藥，未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對Loratadine及pseudoephedrine或其他藥品過敏。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在使用的藥品(包括非處方藥)，尤其是毛地黃、其他過敏藥及維他命。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病。
4. 如果您將進行手術(包含牙科手術)，記得告訴醫師或牙醫師您正在使用本藥品。
5. 應小心使用於青光眼、消化性潰瘍狹窄、幽門十二指腸阻塞、前列腺肥大或膀胱頸阻塞、心臟血管疾病、眼內壓增高或糖尿病之病人。
6. 可能會引起中樞神經刺激、興奮或痙攣的作用，對於年紀大於六十歲以上之病患，應小心服用。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

盡可能在您想起時，立刻補服一個劑量；但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

臨床試驗除了失眠與口乾外，其他副作用並不常見，如：眩暈、疲倦、噁心、厭食、口渴、心跳過速等。

◆ 此藥儲存時的條件為何？

- 將藥品存放於容器中並置於小孩拿不到的地方。
- 本藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和直接的陽光照射。
- 過期或不再需要的藥品應丟棄。將藥錠從錫箔片裝中取出，並收集於夾鏈袋，隨一般垃圾丟棄即可。

◆ (準備)懷孕婦女注意事項：

若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師(孕婦用藥等級：**B**)。如您計畫懷孕、在服藥期間已懷孕、哺育母乳，就診時請務必告知醫師。

◆ 我該遵守什麼飲食注意事項？

此藥品與葡萄柚汁及含酒精的飲料有顯著的交互作用，為了避免藥效受影響，請勿併服。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡

Loratadine & Pseudoephedrine (LoraPseudo 24h SR) 莫鼻卡 24 小時持續性 膜衣錠

靜思小語：
付出當下，福已在其中。

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150
花蓮(03) 856-1825 轉 3345
大林(05) 264-8000 轉 5384
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(02)6628-9779 轉
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您

指導卡並無法詳盡 **Pseudoephedrine & Loratadine** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。