

Glyburide 5mg / Metformin 500mg

◆ 商品名：

Glucomet (克糖美錠)

◆ 醫生為何開此藥給我？

1. Glucomet 為複方由 glyburide 及 metformin 組成，為治療第二型糖尿病的藥品。
2. glyburide 能刺激胰臟分泌胰島素，並幫助身體更有效率的使用胰島素來降低血糖。metformin 可降低由食物中攝取及肝臟製造的葡萄糖含量，並增加身體對胰島素的敏感性。
3. 此藥也可用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆ 該如何使用此藥品？

1. 此藥為口服錠劑，通常是一天服用一到兩次，與食物併服。請遵照醫師的指示用藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
2. 未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。此藥只能控制血糖並不能治癒糖尿病，因此即使覺得症狀好轉還是要繼續服藥。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

- 請告訴醫師或藥師，您是否對 glyburide、metformin 或其他藥品有過敏的反應。
- 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥品(包含非處方藥)，特別是口服降血糖藥品，維他命及中草藥。
- 請告訴醫師，您目前或曾有的肝臟病、腎臟病、心臟病、腦下垂體或甲狀腺疾病、腎上腺素不足、急性或慢性代謝酸中毒、糖尿病酮酸血症。
- 如果需要做服用顯影劑的檢查請告訴醫生您有在服用此藥，醫師會請您在檢查前停藥數天。
- 如果您將要進行手術(包含牙科手術)，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用此藥。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

儘可能在您想起時立刻補服，若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，並繼續按照原本的用藥方式。不要為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

雖然此藥導致的副作用並不常見，但還是可能發生。

- 若有以下**低血糖**症狀，請使用含有糖分的食物或飲料，如糖果或果汁，並且儘快通知您的醫師；**低血糖症狀包含**：搖晃、眩暈、心悸、出汗或混亂、視力模糊、頭痛、嘴巴感到麻木或刺

痛、虛弱、疲勞、臉色蒼白、突然飢餓。

- 若有以下任一高血糖症狀，請儘快通知您的醫師：頭痛、鼻塞或流鼻水、胃痛、咳嗽及腹瀉、乳酸中毒(乳酸中毒是一種不常發生但卻是很嚴重的副作用，它的症狀有呼吸急促、昏睡、酸痛、全身不適、畏寒、眩暈。)
- 若您有下列任一症狀，請立刻就醫：嚴重呼吸困難、肌肉痛、服藥數週後腹痛、異常疲倦、心跳變慢或不規則、皮膚發疹、發紅、嚴重曬傷、皮膚或眼睛變黃、大便顏色變淡、尿色變深、不正常出血或瘀血、持續發燒。

◆ 此藥儲存時的條件為何？

- 將藥品存放於容器中並置於小孩拿不到的地方。
- 本藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和直接的陽光照射。
- 過期或不再需要的藥品應丟棄。將藥錠從錫箔片裝中取出，並收集於夾鏈袋，隨一般垃圾丟棄即可。

◆ 我還應知道什麼其他資訊？

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查以確定您對本藥的反應。
2. 您也可用血糖機自行測量血糖並紀錄結果。如果您的血糖升高，請告知您的醫師。

3. 不要讓任何人服用您的藥品。

◆(準備)懷孕婦女注意事項：

若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師(孕婦用藥等級：**B**)。如您計畫懷孕、在服藥期間已懷孕、哺育母乳，就診時請務必告知醫師。

◆我該遵守什麼飲食注意事項？

1. 請遵循您的醫師或營養師所指導的運動及飲食建議。健康的飲食非常重要。
2. 酒精會降低血糖，請詢問醫師可以飲用的安全量。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡

靜思小語：
付出當下，福已在其中。

Glyburide & Metformin (Glucomet®) 克糖美錠

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150
花蓮(03) 856-1825 轉 3345
大林(05) 264-8000 轉 5384
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(02)6628-9779 轉
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您

指導卡並無法詳盡 Glyburide / Metformin 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。