

## Finasteride

### ◆ 商品名：

**Propecia 1mg/tab** (柔沛膜衣錠)

### ◆ 醫生為何開此藥給我？

Finasteride用於治療良性攝護腺肥大。攝護腺肥大造成排尿方面的問題，尤其是晚上；此藥可以縮小攝護腺以及改善症狀。此藥還有用於其他病症，如：治療雄性禿頭，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

### ◆ 該如何使用此藥品？

1. Finasteride是口服錠劑，通常一天服用一次，可與食物併服。服用次數及每次劑量請遵照醫師的指示用藥，如果對於藥品有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
2. 未經醫師指示不可自調整劑量或增加服藥次數。覺得情況有改善時，在沒有告訴醫師之前，不能自行停藥。

### ◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對

finasteride或其他藥品過敏。

2. 本藥可能透過皮膚吸收，當藥品遭壓碎時，懷孕或可能懷孕婦女不可碰觸，否則會對胎兒有影響。
3. 請告訴醫師或藥師，您正在使用的藥品(包括非處方藥)，尤其是其他感冒、過敏藥及維他命。
4. 請告訴醫師，您目前或曾有過的肝臟疾病或泌尿道的問題。
5. 如果您將進行手術(包含牙科手術)，請告訴醫師或牙醫師您正在使用的藥品。
6. 婦女及兒童不建議使用本品。
7. 肝功能異常者需小心使用。

### ◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

儘可能在您想起時立刻補服一個劑量，但若幾乎到了服用下一個劑量的時間，那就略去錯過的劑量並繼續按照原本的用藥方式。千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

### ◆ 此藥會造成什麼副作用？

雖然此藥導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若是有以下的症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請儘快通知您的醫師：性慾減低或性無能、精液減少、乳房腫脹。

### ◆ 此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於小孩拿不到的地方。將藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和避免直接的陽光照射。將過期或不再需要的藥品應丟棄。請教藥師如何適當地處理此藥。

### ◆ 我還應知道什麼其他資訊？

1. 使用此藥期間需避孕。
2. 使用此藥期間及停藥後一個月內，不可捐血。
3. Finasteride可能會降低攝護腺癌的特異性指標(PSA)，故若您有做相關檢驗時，請告訴醫師您正在使用本品。
4. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查來確定您對本藥的反應，必要時讓醫生為您調整劑量。
5. 不要讓任何人服用您的藥品。

### ★ 孕婦用藥等級及注意事項

本品可導致胎兒畸形，孕婦禁用。已懷孕或可能懷孕婦女不可碰觸壓碎或破損的finasteride錠劑。如您計劃準備懷孕或是服藥期間已懷孕，請務必告知醫師。(孕婦用藥等級：X)

### ★ 嬰兒哺乳等級及注意事項

若您給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。

★ 我該遵守什麼飲食注意事項？

健康食品，如：聖約翰草(St John's wort) 可能會降低本品的療效，因此在您使用健康食品時請先詢問醫師或藥師。

守護健康、守護生命、守護愛



佛教慈濟醫療財團法人

台北慈濟醫院  
Taipei Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation



病人用藥指導卡

財團法人

台北慈濟醫院

靜思小語：

付出當下，福已在其中。

Finasteride  
(Propecia®)

柔沛

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(02)6628-9779 轉

2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您

指導卡並無法詳盡 **Finasteride** 的全部資訊，  
如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，  
我們將竭誠為您服務。