

Saxagliptin

◆ 商品名：

Onglyza 5mg/錠 (昂格莎膜衣錠)

◆ 醫生為何開此藥給我？

Saxagliptin用於治療第二型糖尿病(非胰島素依賴型)的藥品，經抑制腸泌素(incretin)之水解作用，可增強腸泌素作用進而增加胰島素之分泌，以達到降血糖的效果。您可詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆ 該如何使用此藥品？

1. 此藥為口服錠劑，通常是一天服用一次，空腹或與食物併服皆可。請遵照醫師的指示用藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
2. 未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。此藥只能控制血糖並不能治癒糖尿病，因此即使覺得症狀好轉還是要繼續服藥。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

- 請告訴醫師或藥師，您是否對saxagliptin或其他藥品有過敏的反應。
- 請告訴醫師或藥師您正在使用的藥品(包含非處方藥)，特別是Ketoconazole、atazanavir、clarithromycin、indinavir、itraconazole、nefazodone、nelfinavir、ritonavir、saquinavir、telithromycin)，維他命、營養補充品及中草藥。
- 請告訴醫師您目前或曾有過的疾病，如胰臟炎、膽結石或腎臟疾病。
- 如果您將要進行手術(包含牙科手術)，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用saxagliptin。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

儘可能在您想起時立刻補服一個劑量，若已接近下次吃藥時間，就略過此次劑量，並繼續按照原本的用藥方式。不要為了補吃上次錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

雖然saxagliptin導致的副作用並不常見，但還是可能發生。

- 若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請儘快通知您的醫師：腹痛或胃痛、腹瀉、蕁麻疹、沒有食慾、呼吸困難、皮膚疹、鼻塞或流鼻水、嘔吐、無力。
- 若您有下列任何一種症狀，請立刻就醫：焦慮、血尿或膿尿、水腫、視力模糊、發冷或冒冷汗、臉色蒼白、暈厥、憂鬱、排尿困難、呼吸困難、心悸、發燒、頭痛、沒有聲音、下背痛、鼻塞、噁心、快速體重增加、癲癇發作、說話不清、喉嚨痛、手腳刺痛、不尋常的無力或疲倦。

◆ 此藥儲存時的條件為何？

- 將藥品存放於容器中並置於小孩拿不到的地方。
- 本藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和直接的陽光照射。
- 過期或不再需要的藥品應丟棄。將藥錠從錫箔片裝中取出，並收集於夾鏈袋，隨一般垃圾丟棄即可。

◆ 我還應知道什麼其他資訊？

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查以確定您對本藥的反應。
2. 您也可用血糖機自行測量血糖並紀錄結果。如果您的血糖升高，請告知您的醫師。
3. 不要讓任何人服用您的藥品。

◆(準備)懷孕婦女注意事項：

若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師(孕婦用藥等級：**B**)。如您計畫懷孕、在服藥期間已懷孕、哺育母乳，就診時請務必告知醫師。

◆我該遵守什麼飲食注意事項？

1. 請遵循您的醫師或營養師所指導的運動及飲食建議。健康的飲食非常重要。
2. 酒精會降低血糖，請詢問醫師可以飲用的安全量。

指導卡並無法詳盡 **Saxagliptin** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。

守護健康、守護生命、守護愛



靜思小語：
人要知福，惜福，再造福。

各院區藥物諮詢電話：
台北(02) 6628-9779 轉 2150
花蓮(03) 856-1825 轉 3345
大林(05) 264-8000 轉 5384
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

病人用藥指導卡

Saxagliptin
(Onglyza[®])

昂格莎膜衣錠

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(02)6628-9779 轉
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您