

“安星”鹽酸二苯胺明注射液
Diphenhydramine HCl Injection “Astar”
——Allergy疾患治療劑——

關於喘息蕁麻疹及其他所謂Allergy疾患之起因，曾引起醫療界之爭辯，雖然尚未得到最後結論，但被認為係由各類似Histamine物質所引起之說似無疑問，將這些Histamine物質以治療Allergy疾患之藥物即所謂Antihistamic Drug。

【成分】每1毫升中含有
Diphenhydramine HCl.....30mg
及Sodium Chloride、Benzyl Alcohol、Water For Injection。

【適應症】過敏性疾患（氣喘、蕁麻疹、皮膚搔癢症、濕疹、鼻炎、X線醉）。

【注意事項】1.有催眠作用，投予本劑後勿從事駕駛或操作危險機械。
2.青光眼、前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾患禁用。
3.出現發疹等過敏症狀應停藥。
4.副作用包括循環器官動悸、眩暈、倦怠感、神經過敏、頭痛、睡意、口渴、噁心、嘔吐、下痢等症狀。
5.和中樞抑制劑MAO阻礙劑併用或飲酒會增加其作用，應減量並慎重使用。
6.孕婦、授乳婦應慎重給藥。
7.避光保存。

【用法用量】1.成人通常每日一次，每次一支30毫克，小兒減半；注射於皮下肌肉內或靜脈注射，本劑限由醫師使用。
2.早產兒(premature infants)及新生兒(neonate)不建議使用。
3.老人宜以最低有效起始劑量開始治療。
4.腎功能不全者應延長給藥間隔(interval)；輕度(GFR > 50mL/min):間隔6小時；中度(GFR 10~50mL/min):間隔6~12小時；重度(GFR < 10mL/min):間隔12~18小時。
5.本品以靜脈注射時，每次diphenhydramine之劑量以10mg-50mg為宜，且其注射速率不宜超過25mg/min。

【儲存條件及注意事項】於室溫(15~30℃)下，避光儲存。

【包裝】1毫升 / 安瓿 100支以下盒裝。

安星製藥股份有限公司
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號

②