



## 暢利 糖衣錠

## Nicametate Citrate (SALINE®) 50 mg/tab



### 為什麼我要使用這個藥？

此藥品用於治療末梢血管循環障礙。

### 應該如何使用此藥物？

1. 用法及劑量應遵照醫師指示服用，不可自行增減藥。若有任何疑問都可以詢問醫師或藥師。
2. 此藥為口服錠劑，一般建議用法為一天服用 2-3 次，每次口服 1-2 錠。

### 如果您忘記服藥該怎麼辦？

若忘了服藥，在想起時盡快服用；但若已接近下次服藥時間，則跳過一次的劑量，不可服用 2 倍的劑量。

### 可能引起之副作用？

此藥引起的副作用並不常見，但還是可能會發生。

常見的副作用：噁心、腹痛、腹瀉、心悸、眩暈、倦怠、臉部潮紅或頭痛等；若上述這些症狀持續、變嚴重或令您感到困擾，請告知醫師。

假如您發生下列副作用，請立即就醫：過敏反應（如皮膚發癢、起紅疹或呼吸困難）等。

### 如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病（如肝、腎功能異常）

### 當使用這個藥品，我該注意什麼？

1. 一般狀況此藥品可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥物讓醫師知道才可做最好的評估。
2. 此藥會使部分人感覺頭昏嗜睡，在駕駛及操作器械時請小心。

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫、避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。