

## Mephenoxalone

### ◆成分劑量：

Mephenoxalone 200mg/tab

### ◆藥品作用：

Mephenoxalone 用來減緩由脊髓或肌肉痙攣引起之疼痛。請詢問醫師或藥師可獲得更多相關資訊。

### ◆該如何使用此藥品？

請確實依照醫師指示服用，成人一天三次，每次 1~2 錠；若經醫師認可劑量可增至一天 8~10 錠。小兒劑量 6~12 歲一天三次，每次 1/2 錠。藥物放置處應遠離兒童，也不要將藥物分給其他人服用。若有任何疑問都可以詢問醫師或藥師。

### ◆忘記服藥時該怎麼辦？

若您的醫師請您定時服用 Mephenoxalone，儘可能在您想起時立刻補服，若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量

而服用雙倍藥量。

### ◆使用此藥品須注意什麼事項？

- 請告訴醫師及藥師，您是否對 Mephenoxalone 或其他藥物過敏。
- 請告訴醫師及藥師您目前服用的藥物(包括處方藥或成藥)。
- 服用此藥品後易有嗜睡的情況，因此服藥後應避免操縱危險性器械或是開車。
- 飲酒會加重服藥後嗜睡之症狀，因此服藥期間請勿飲酒。

### ◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

雖然 Mephenoxalone 引起的副作用並不常見，但仍可能發生。若以下症狀嚴重或無法消除，請儘快告知醫師：

- 頭痛
- 嘔吐
- 腹瀉
- 心悸
- 暈眩
- 視覺障礙
- 胃部不適
- 無力感
- 運動失調
- 皮膚紅腫、發癢

### ◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

### ◆是否有其他我應該知道的資訊？

一般狀況下本藥品可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥品讓醫師或藥師知道，才可做最好的評估。請不要讓其他人使用您的藥物。

佛教慈濟醫療財團法人

台中慈濟醫院

Taichung Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

50

# Mephenoxalone

病人用藥指導卡

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。



各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

台中(04) 3606-0666 轉 3355

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(04) 3606-0833

(04) 3606-0666 轉 3355

指導卡並無法詳載 **Mephenoxalone** 的全部資訊，如果使用藥品有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。

我們將竭誠為您服務。

守護健康、守護生命、守護愛

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院  
藥學部 關心您