

# 新版 190 x 134mm

“井田”

鎮咳、氣喘治療劑

內衛藥製字第016650號

Code No:1303

## 鹽酸消旋甲基麻黃鹼錠

DL-METHYLEPHEDRINE HCL Tablets “Chinteng”

【成分】：每錠含（Each tablet contains）：  
dl-Methylephedrine Hydrochloride.....25mg

【賦形劑】：Lactose、Potato Starch、Povidone、Magnesium Stearate.

【作用】：(1) 本品能擴張支氣管，及減輕鼻黏膜充血，為支氣管氣喘病之有效治療劑。

(2) 本品具有強力抗Allergy作用，且無一般抗組織胺劑所發生之睡氣，全身倦怠之副作用，故治療Allergy疾患為良好安全之治療劑。

【適應症】：支氣管氣喘、蕁麻疹、過敏性疾患。

【用法用量】：通常成人一回1-2錠，重症時2-3錠，一日三回服用，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：(一) 一般的注意：

(1) 用法、用量在於正常的使用範圍內服用，若有不適之情況產生時要中止服用，小兒投與時要正確的指導服用，其服用後的經過要小心的觀察。

(2) 過度使用連續的情況時有不整脈的現象產生要立即停止服用。

(二) 慎重投與：

(1) 甲狀腺機能亢進症。

(2) 高血壓。

(3) 心疾患。

(4) 糖尿病。

(三) 副作用：

(1) 循環器系：偶有心悸、亢進、顏面蒼白等的症狀出現。

(2) 精神、神經系：偶有頭痛、熱感、間有不眠、眩暈、神經過敏、疲勞等症狀出現。

(3) 胃腸：偶有噁心、食慾不振、腹部膨滿感等的症狀出現。

(4) 過敏症：發疹等的過敏症狀出現的情況時，要立即停藥。

(5) 其他：偶有口渴現象出現。

(四) 相互作用：

(1) 和MAO抑制劑、甲狀腺製劑，併用時有增強的現象，因此要減量服用。

(2) 和Catecholamine併用有不整脈的情況產生時，要立即停用或避免併用。

(五) 遮光保存。

【包裝】：3~1000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。



PIC/S G.M.P.

PIC/S G.M.P. 認證&國際ISO 9001驗證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

TEL：(04)26814585-7(三線)

諮詢專線：(0800)461461

20180301版本