

“麥迪森” 護眼 眼藥水0.01%
Eyehelp Eye Drops 0.01%

【作用】

Neostigmine是將Cholinesterase暫時不活化，以抑制Acetylcholine之被分解，同時間接增加Acetylcholine之作用，為自然促進類似Acetylcholine作用之副交感神經興奮劑。

【成分】

Each mL contains :

Neostigmine Methylsulfate 0.1mg

賦形劑：Boric Acid, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Distilled Water

【適應症】

眼球肌肉症狀之改善。

【用法·用量】

本藥須由醫師處方使用。

每次2滴，一日三次，視症狀適宜增減。

【注意事項】

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- (三) 使用前，請洗淨雙手。
- (四) 請依照藥品標示使用。
- (五) 過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶30天後請勿繼續使用。
- (六) 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
- (七) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。
- (八) 使用兩種眼藥水時，請隔開至少5分鐘後點藥。
- (九) 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。
- (十) 開瓶注意事項：產品於開啟使用前，先以順時針方式往下旋緊一圈後再逆時針旋轉開瓶使用，以利藥液滴出。
- (十一) 保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

【警語】

- (一) 以下情況應停藥立即就醫：
 - (A) 連續使用三天（或72小時）症狀未解除。
 - (B) 使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (C) 發生過敏反應。
 - (D) 青光眼（Glaucoma）患者。
- (二) 對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
- (三) 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。
- (四) 過度使用血管收縮劑會增加眼睛紅腫。
- (五) 青光眼患者，除非經醫師指示，否則不要使用含血管收縮成分之製劑。

【性狀】


本品為無色澄明眼藥水。

pH值：5.0~7.0

滲透壓比：1.0（與生理食鹽水比）

性狀：白色結晶性粉末，無味，略溶於水，易溶於 Ethanol。

有效成分Neostigmine methylsulfate之化學構造式



一般名：Neostigmine methylsulfate

化學名：3-dimethyl carbamoxyphenyl trimethylammonium methylsulfate

分子式：C₁₃H₂₂N₂O₆S

分子量：334.39

融 點：145~149°

【儲存】

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫度環境或冰箱中，瓶蓋應緊蓋。需置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

100公撮以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第046990號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司

台北市中正區林森南路十號五樓

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

桃園市桃園區桃鶯路445-2號

ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD.

No.445-2, Taoying Rd, Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)