



“永信”

特佳 Decan

注射液

Injection "Yung Shin"

1936年Reichstein由副腎皮質抽出結晶性之Steroid-Corticosterone而為副腎皮質荷爾蒙的研究開創了新的紀元，以後各國學者紛紛致力於這方面的探討，因此迭經改良的製品有如雨後春筍地逐年應市，如Cortisone (1949), Hydrocortisone (1952), Prednisolone (1955), Triamcinolone (1957) 等是。1958年推出之Dexamethasone為這一類製劑中之佼佼者，係Prednisolone之同族體，其用量少，療效高，藥力強，副作用少，且使用上相當安全，臨床上廣泛使用，而獲得很高的評價。

【成分】每mL中含：

Dexamethasone Sodium Phosphate 2.2 mg
(Equivalent to Dexamethasone Phosphate 2.0 mg)

【特徵】

1. 本藥之藥力強：
根據臨床實驗顯示本藥的抗炎症效果比時下所用之其他副腎皮質類固醇製劑都來得強，平均較Cortisone強35倍，較Hydrocortisone強28倍，較Prednisolone強7~10倍，較Triamcinolone及Methylprednisolone亦強5倍，以小劑量投與，即可得到強力的藥效。
2. 本藥之療效高：
以最近之文獻報告而統計，至少有95%以上的病人當他們使用本藥之後，其病情不論在主觀上或客觀上均得到迅速的改善。
3. 本藥之作用安全：
 - ①本藥無鉀鹽之過度損耗，亦不引起鈉鹽及水份之滯留，因此不會有浮腫之現象。精密的新陳代謝試驗顯示，即使將一日劑量增加到5倍之多，其血鉀的濃度仍維持原狀，故使用期間內不需限制食餌（鈉之攝取量），亦無需特別補充鉀質。
 - ②本藥之抗炎症、抗風濕及抗過敏性的效力雖然增加了30倍之多，但它對血糖的作用並未增加，故較無一般類固醇製劑之誘發糖尿病作用。
 - ③本藥不致引起骨质疏松症、肌肉無力及精神障礙等後遺症狀。
 - ④本藥不影響血壓，不致引起高血壓症，有高血壓合併症者亦可安心使用。
4. 本藥屬速效性（15~30分鐘內）可經各種注射法而廣範圍應用於全身各部位，吸收快，藥效顯著。
5. 本藥極適用於危急情況而須施行副腎皮質荷爾蒙療法之場合，會有預期的效果。

【適應症】

急、慢性風濕、風濕性關節炎、急性痛風性關節炎、肌炎、皮膚炎、濕疹、癬症、過敏性皮膚炎、炎症性眼疾。

【用法·用量】

1. 靜脈、肌肉注射：急性副腎皮質機能不全症、腦下垂體前葉機能失調、休克侵襲症狀、血液疾患之手術準備、衰弱患者之手術準備、支氣管氣喘、重症感染症（危急時）、氣喘、急性藥物中毒等，成人每次2-10 mg，每日使用數次，但一天量不宜超過80 mg。
2. 關節腔內注射：癱瘓質斯性關節炎、骨關節炎、風濕性關節炎、急性痛風性關節炎，成人於膝關節或大關節每次4-6 mg，指骨關節、小關節每次0.8-1 mg。
3. 軟組織內注射：肌炎、肌鞘炎、纖維肌炎、結節性動脈周圍炎、癱瘓質斯性肌炎、坐骨神經症、泛發性結合織炎等，成人每次2-6 mg。
4. 皮下注射：泛發性皮膚炎、小兒濕疹、神經性皮膚炎、過敏性皮膚炎、天皰瘡、乾癬、苔癬等，成人通常以生理食鹽水稀釋5倍後，每次0.5 mg之量注入皮下。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- A 急、慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
- B 因主要副作用為引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
- C 糖尿病患者使用時，應注意增加Insulin之用量的必要。
- D 對於有精神病因素者多加注意。
- E 使用本藥期間請充分補充蛋白質。
- F 對消化管障礙如胃腸潰瘍患者務請特別注意。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫（15~30℃）儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

- 1 公撮，2 公撮，10, 50, 100 安瓿裝。
- 10 公撮，1, 10, 50, 100 小瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電話：(04) 26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號