

Lorazepam (Lowen[®]，樂穩)

作用：

Lorazepam 屬於 benzodiazepine 類藥物，用來治療焦慮症、失眠（睡眠障礙）及憂鬱症引發的焦慮感。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵照醫師指示按時服用，不要過量。
- ◆ 可以空腹或與食物一起服用。
- ◆ 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
- ◆ 藥物放置處應遠離兒童。
- ◆ 不要將藥物與他人分享。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果距離吃藥時間已經超過一個小時，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 一般狀況下 lorazepam 可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥物讓醫師知道才可做最好的評估。
- ◆ 假如您正在服用會引起嗜睡的藥物，如麻醉性止痛藥、鎮靜劑、安眠藥或感冒過敏藥等，請事先告知醫師。
- ◆ 服藥期間避免喝酒、咖啡、茶或含有咖啡因的飲料。

醫療提示：

- ◆ 假如您正在懷孕或哺乳，請於服藥前告知您的醫師。
- ◆ 假如您有青光眼、肺病或肝病，請事先告知您的醫師。
- ◆ 服用此藥會形成習慣性，請不要超過醫師所指示的藥量及天數服用。
- ◆ 若沒有經過醫師的指示，不要突然自行停藥。您需要慢慢減輕藥量，直到完全不用為止。
- ◆ 此藥會使您想睡，避免駕駛及操作器械或從事危險活動。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：
心情憂鬱或嚴重的心智混亂、昏睡及虛脫、心跳緩慢、呼吸困難、搖晃、不能站立。
- ◆ 假如您發生下列比較不具重要性的副作用，可告知醫師：
視力模糊、頭痛、嗜睡、頭昏、行動遲緩或注意力不集中、噁心嘔吐、口乾、腹瀉或便秘、隔天產生宿醉現象。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～