

Misoprostol (Cytotec[®]，喜克潰)

作用：

Misoprostol 可用來預防胃潰瘍以及因長期服用止痛劑產生胃發炎、疼痛。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵醫師指示服用本藥，服藥前需先閱讀藥品說明書。
- ◆ Misoprostol 需與食物併用或於飯後及睡前服用。
- ◆ 若您無法整粒吞服可咬碎後再吞。
- ◆ 藥物存放應遠離兒童，也不要分送他人服用。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 於想起來時盡快服用，除非已經超過二小時。
- ◆ 若已接近下一次服藥時間，請不要加倍服用所忘記的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 於服藥前先詢問您的醫師或藥師，是否可與其他藥物(包括成藥)併用。
- ◆ 不要與含有鎂的製酸劑併用(像是Maalox[®]或Mylanta[®])。

警語：

- ◆ 懷孕、哺乳時請不要服用本藥。
- ◆ 服藥期間需避孕，若發現懷孕或想懷孕請立刻告知醫師。
- ◆ 服藥前先確定沒有懷孕，於月經週期的第二或第三天開始服用。
- ◆ 讓您的醫師先知道您是否有腎臟問題、痙攣、胃潰瘍或庫新斯症候群、結腸癌、腸內疾病。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：
月經後出血、嚴重下痢。
- ◆ 假如您發生下列比較不具重要性的副作用，可告知醫師：
腹痛、下痢、消化不良或脹氣、頭痛、便秘。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～