

愛克痰顆粒66.7毫克/公克

Actein Granules 66.7mg/gm

衛署藥製字 第 037598 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2023-11-10

呼吸道黏液溶解劑

【特性】

- 本藥係採用祛痰劑Acetylcysteine為主成分，所研合而成之顆粒劑。
- Acetylcysteine能幫助黏液(例如：痰液)分解，降低痰的粘稠度而更容易排出。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每公克中含有：

Acetylcysteine.....66.7mg.

1.2 其他成分(賦形劑)

Dextrose、Sunset Yellow FCF、Saccharin Sodium、Orange Powder

2 用途(適應症)

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

3.2.2 3歲以下。

3.2.3 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 65歲以上。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 不得與含酒精飲料併用。

3.4.5 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

4 用法用量

年齡	劑量
成人及12歲以上	成人每次3公克，一天3次。
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2。
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4。
3歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 若有任何不適情形產生。

5.1.2 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發情形。

5.1.3 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。

5.1.4 偶有發疹等過敏症狀。

5.1.5 其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

6 包裝

6-333包盒裝，1.5gm, 3gm鋁箔包裝。

7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

8 儲存方式

本品極易吸濕，請貯存於25°C以下乾燥處所。



製造廠

優良化學製藥股份有限公司

新竹縣湖口鄉中興村光復路10號

藥商

健喬信元醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉工業一路6號