

# Terazosin

## ◆ 商品名：

Terazosin 2mg/錠 (替你舒壓)

## ◆ 醫生為何開此藥給我？

Terazosin 可用來治療高血壓，它透過放鬆血管，使得血液能夠更容易的流經全身。此外也可用來治療男性的良性前列腺增生。此藥也可用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

## ◆ 該如何使用此藥品？

1. Terazosin是口服錠劑，通常一天一次於睡前服用。請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
2. Terazosin控制高血壓及良性前列腺增生的症狀，但不能治癒疾病。即使您已感覺好轉，仍應繼續服用此藥。未經醫師同意前不可自行停用此藥。

## ◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 terazosin、doxazosin、prazosin或其他藥品有過敏的反應。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥品(包含非處方藥)，特別是乙型阻斷劑，如：acebutolol、atenolol、bisoprolol、carteolol、carvedilol、labetalol、metoprolol、nadolol、oxprenolol、sotalol及timolol；clonidine、verapamil及維他命。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過肝臟疾病。
4. 若您要進行手術(包含牙科手術)，記得告訴醫師或牙醫師您正使用此藥。
5. 此藥可能會導致嗜睡或暈眩，在您首次使用terazosin或增加劑量的十二至二十四小時不要開車或操作危險機械。
6. 建議最好睡前服用第一個劑量。以避免低血壓而昏暈。

## ◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

盡可能在您想起時，立刻補服一個劑量；但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

## ◆ 此藥會造成什麼副作用？

1. Terazosin導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或無法消除時，請盡快告知您的醫師：眩暈、頭痛、倦怠、視力模糊、性能力降低、神經不安、多尿、胃不舒服、嘔吐、腹瀉、便秘、脹氣、肌肉無力或疼痛、耳鳴、口乾、鼻塞、睡眠障礙。
2. 若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：呼吸困難、心搏過速、心律不整、胸痛、皮膚紅疹、腳或足踝的水腫、昏厥。

## ◆ 此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於小孩拿不到的地方。將藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和避免直接的陽光照射。過期或不再需要的藥品應丟棄。請教藥師如何適當地處理此藥。

## ◆ 我還應知道什麼其他資訊？

1. 要定期回診，定期測量血壓以確定您對本藥的反應。
2. 不要讓任何人服用你的藥品。

## ★ 孕婦用藥等級及注意事項

若您已懷孕或計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。(孕婦用藥等級：C)

★ 嬰兒哺乳等級及注意事項

若您給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。

守護健康、守護生命、守護愛



★ 我該遵守什麼飲食注意事項？

醫師可能會開立低鹽或低鈉飲食，應確實遵照這些指示。



病人用藥指導卡

靜思小語：  
付出當下，福已在其中。

**Terazosin**  
**(Terazosin<sup>®</sup>)**

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150  
花蓮(03) 856-1825 轉 3345  
大林(05) 264-8000 轉 5384  
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口  
諮詢電話：(02)6628-9779 轉  
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

指導卡並無法詳盡 **Terazosin** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。

台北慈濟醫院藥學部 關心您